

歯科用局所麻酔剤 添付文書改訂箇所一覧

H18.10.2

No	項目	内容	リドカイン・ (酒石酸水素) エピネフリン	プロピトカイン・ フェリプレシン	プロピトカイン・ 酒石酸水素 エピネフリン	メピバカイン
1	「禁忌」	「アニリド系」の記載を「アミド型」に変更する。	○	○	○	○
2	「慎重投与」	「(1)高齢者又は全身状態が不良な患者…」の項に「重要な基本的注意」を追記する。	○	○	○	○
3	「相互作用」	肝代謝酵素を追記する。	○			
		「併用注意」の項に「クラス 抗不整脈薬」を追記する。	○	○	○	○
4	「副作用」 「(2)その他の副作用」	「消化器」の項目を新設し、「中枢神経」の項から「悪心・嘔吐等」を移動する。	○	○	○	○
		「中枢神経」の項目に「頭痛」を追記する。	○			
		「循環器」の項目を新設し、「動悸、頻脈、血圧上昇等」を追記する。	○			
		「投与部位」の項目を新設し、「潰瘍、壊死等」を追記する。	○			
		「投与部位」の項目を新設し、「潰瘍等」を追記する。			○	
		「注」 「適応上の注意」の項参照」を追記する。	○		○	